



المديرية العامة للثروة الحيوانية
دائرة الإرشاد والإنتاج الحيواني

إلتهاب الضرع



تنفيذ :

دائرة الإعلام التنموي

العلاج:

- الإسراع بأخذ الحيوان للعيادة البيطرية للكشف عليه.
- يوصى بحلب الضرع المصاب كل ١-٢ ساعة والتخلص من الحليب.
- إعطاء العلاج المناسب حسب توصيات الطبيب البيطري.

وتذكر أخي المربي أن:

استخدام العجول الرضيعة في رضاعة أمهاتها مع نهاية كل حلبة تعتبر وقاية طبيعية من التهاب الضرع .

أخي المربي :

إلتهاب الضرع من الأمراض التي تسبب خسائر مادية من تكاليف العلاج ونقص الإنتاج من الحليب

اتبع إرشاداتنا لتحمي حيواناتك من هذا المرض لمزيد من المعلومات
يرجى مراجعة الطبيب البيطري المختص في منطقتك.



مع خبات :

المديرية العامة للثروة الحيوانية
دائرة الإرشاد والإنتاج الحيواني



www.maf.gov.om

www.facebook.com/agrifish.oman

www.twitter.com/agrifish.oman

www.youtube.com/user/moaoman

أخي المربي:

إلتهاب الضرع يصيب كل الحيوانات الحلابة ويسبب خسائر اقتصادية سنوية كبيرة جدا حيث يقلل من إنتاج وجودة الحليب .
فاحرص أخي المربي على وقاية حيواناتك من التهاب الضرع ووفر العلاج المناسب .

أسباب المرض:

- أنواع من الميكروبات وغالبا البكتيريا والتي تنتقل عن طريق:
- 1- التلوث من البيئة المحيطة بالحيوان عن طريق الحلمات.
 - 2- الجروح والتشققات التي توجد بالضرع.
 - 3- بعض الأمراض المعدية .

أعراض التهاب الضرع:

- تورم واحمرار الجزء المصاب ويكون مؤلم للحيوان عند اللمس .
- ارتفاع درجة حرارة الجزء المصاب بالضرع أو انخفاضها .
- تغيير في مكونات الحليب .
- الحليب يكون مائي أو متجبن .
- ظهور دم أو صديد في الحليب .
- خمول الحيوان وامتناعه عن الأكل .
- مع تقدم الإصابة يصبح الريح المصاب متليف .



ضرع أنثى ماعز مصاب بإلتهاب الضرع

احذر عزيزي المربي قد تضطر إلى استئصال الضرع المصاب أو قد يتلف الضرع وبالتالي يؤدي إلى خسارته في إنتاج الحليب .

الوقاية من إلهاب الضرع :

- 1- اغسل الضرع بماء نظيف قبل الحلب وجففه جيدا بقماش نظيف .
- 2- تجنب لبس الخواتم واغسل يديك قبل الحلب .
- 3- اغمس الحلمات في محلول مطهر بعد الحلب مباشرة .
- 4- أن تكون العليقة المقدمة للحيوانات جيدة ومتكاملة .
- 5- اهتم بنظافة أرضية الحظيرة فتلوث الأرضية يساعد على انتقال البكتيريا إلى الضرع وإصابته .
- 6- عزل الحيوان المصاب .

أخي المربي :

- احرص عند شرائك للحيوان التأكد من:
- 1- عدم وجود تشققات أو بثور بالضرع .
 - 2- أن يكون الضرع جيد وخالي من التليفات .
- واحرص أيضاً على اختبار قطرات الحليب الأولى باستخدام أطباق سمراء للكشف عن التغيير في مكونات الحليب .

